

Консультационный пункт здоровья
Основное знание «Агнозии
(болезнь с дефектом сознания)»

Прежде рассказывали о «процессе агнозии», а в этом номере ознакомим вас с «состоянием, которое легко можно путать».

Состояние, которое легко можно спутать

***Основное состояние, которое легко можно спутать с «агнозией»**

Хоть и просто говорим «агнозия», но очень много болезней, которые являются причиной «агнозии». К тому же и разнообразны эти состояния. Если даже отличаются от «агнозии», бывает, что проявляются такие же симптомы. Среди таких болезней подобными состояниями особенно легко можно спутать с «сен妄 (химера)» и «うつ状態(депрессивное состояние)». Что касается «химеры» и «депрессивного состояния», то при соответствующем лечении улучшается состояние, поэтому очень важно различать эти болезни от «агнозии».

健康相談室
認知症の基礎知識

以前に「認知症の経過」を扱いましたが、今号では「間違われやすい状態」について紹介します。

間違われやすい状態

◆認知症と間違われやすい主な状態

認知症といつても、その原因となる病気はたくさんあります。また、その状態も多様です。認知症と異なる病気であっても、同じような状態を示すことがあります。このような病気・状態のなかで特に間違われやすいのが「せん妄」と「うつ状態」です。「せん妄」や「うつ状態」は適切な治療を行うことで改善するので、これらと認知症の区別は大変重要です。

《認知症と間違われやすい主な状態》
«Основное состояние, которое легко можно спутать с «агнозией»»



| | 主な特徴 Основные особенности | 認知症との違い Отличие от «агнозии» |
|-----------------------------|---|--|
| 加齢による もの忘れ | <ul style="list-style-type: none">人の名前が思い出せないことがたまにある <p>Изредка бывает, что не могут вспомнить фамилию и имя человека.</p> | <ul style="list-style-type: none">ある体験の一部を忘れる（認知症では、食事をしたことそのものを忘れるなど、ある体験の全部を忘れる） |
| Забывчивость от старения | <ul style="list-style-type: none">度忘れをする | <p>Забывается часть прошедшей ситуации (В случае «агнозии» забывается даже то, что поел и тому полобное. Полнотью забывается</p> |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| | <p>Внезапно забывается.</p> <ul style="list-style-type: none"> ある体験の一部を忘れる（一昨日の味噌汁の具を忘れた、昨夜のTV番組の俳優のフルネームを度忘れした、など） <p>Забывается часть прошлой ситуации (Забываются продукты (ингредиенты) позавчерашнего супа из соевой пасты; Внезапно забывается фамилия и имя актёра, который выступал во вчерашней телепередаче и т. д.)</p> | <p>прошедшая ситуация.)</p> <ul style="list-style-type: none"> もの忘れはあっても日常生活に支障はない <p>Хоть и есть забывчивость, но в повседневной жизни нет проблем.</p> <ul style="list-style-type: none"> 時間や場所などがわからなくなることはない <p>Нет такого случая, чтобы забывал время и место.</p> <ul style="list-style-type: none"> きわめて徐々にしか進行しない <p>Продвигается только крайне медленно.</p> |
| うつ状態 Депрессивное состояние | <ul style="list-style-type: none"> 抑うつ気分がある（気持ちが沈む、楽しくない、気力がわからない） <p>Чувство депрессивного состояния (Падают духом; становится неинтересно; нет сил).</p> <ul style="list-style-type: none"> 意欲が低下する（何もしたくない） <p>Наступление состояния апатичности (Ничего не хочется делать.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 不安な気持ちや焦燥感が強い <p>Душевное беспокойство и сильное чувство нетерпеливости</p> <ul style="list-style-type: none"> 不眠や倦怠感がある <p>Есть бессонница и чувство вялости.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 抑うつ気分が継続する <p>Продолжается настроение подавленной депрессии</p> <ul style="list-style-type: none"> 会話によるコミュニケーションは支障なくできる <p>При общении могут разговаривать без проблем</p> <ul style="list-style-type: none"> 記憶は正常 <p>Нормальная память.</p> <ul style="list-style-type: none"> 自殺願望を伴う場合があるので認知症との鑑別が重要 <p>Бывает, что появляется желание самоубийства, поэтому важно различать от «агнозии» (Необходимо быть внимательными, так как иногда одновременно болеют и «агнозией», и депрессивностью).</p> |
| せん妄 Химера | <ul style="list-style-type: none"> 幻視がある（壁に虫が見える、体に昆虫が付いているのが見える） <p>Есть зрительная галлюцинация (Видят на стене насекомого; видят насекомого на теле.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 不安や焦燥感があり、落ち書きがない <p>Не успокаивается, так как есть чувство беспокойства и нетерпеливости.</p> <ul style="list-style-type: none"> 軽い意識障害があり、ほんやりとしたり、返答に時間がかかったりする <p>Бывает лёгкий дефект сознания, рассеянность и на ответ занимает время.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 症状、状態が始まつた時期を特定することができます（何月何日の夜から、など） <p>Можно определить время появления симптомов заболевания и состояние (с вечера какого месяца, дня и т. д.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 夜間に増悪することが多い（夕刻から夜にかけて症状がひどくなる） <p>В большинстве случаев приступы усиливаются в ночное время (Состояние ухудшается с вечера до ночи.)</p> <ul style="list-style-type: none"> 記憶の障害はそれほどでもないが日常生活に支障がある <p>Не очень большой дефект памяти, но отражается на повседневной жизни.</p> |

※ Насчёт различия этих состояний обращайтесь к врачу-специалисту.

※これらの状態との鑑別については、専門の先生を受診しましょう。

**Отличие болезни «химера» от
«агнозии (болезнь с дефектом сознания)»**

Болезнь «химера» – это лёгкий дефект сознания из-за острого заболевания мозга, снижается сообразительность и понимание. Неоднократно бывают галлюцинации и сумабродные мысли, которые приводят в возбуждительное состояние. Что касается отличия болезни «химера» от «болезни с дефектом сознания», то у больных «химерой» в течение дня резко меняются признаки болезни, то есть, есть период «нормального состояния» и наоборот. Бывает, что «нинчхсё» формы «Альцгеймера» приводит к болезни «химера».

『せん妄』と『認知症』の違い

せん妄は、急 性の脳障害に伴っておこる軽い意識障害で、判断 力や理解力が低下し、しばしば幻覚や妄想があらわれて興奮状 態になります。せん妄と認知症の違いは、せん妄の患者さんは一日の中で症状の変化が激しく、「しっかりしている時期」と「そうでない時期」があることです。アルツハイマー型認知症はせん妄を併用することがあります。

| | せん妄 «химера» | 認知症 «агнозия» |
|---|---|---|
| きほん 基本症状 Основные симптомы | 注意・意識障害 しばしば幻視 うんどう ・運動不穩 Vнимание · снижение способности сознания, частые зрительные галлюцинации, неблагонадёжное состояние органов движения | 記憶・認知障害 Снижение способности памяти и сознания |
| はつしょう 発症の仕方 Появление признаков болезни | きゅううげき 急激 Резко | かんじょ 緩徐 Медленно |
| どうようせい 動搖性 Беспокойность | 多い、夜間や夕刻に悪化 やかん や 夕刻 あくか Много, усиливается ночью и вечернее время | すく 少ない Мало |
| じぞく 症状の持続 Продолжительность симптомов | すうじつ 数日間～数週間 Несколько дней ~ несколько недель | えいぞくべき 永続的 Продолжительно |
| すいみんかくせいりずむ 睡眠覚醒リズム障害 Просыпание во время сна | あり Бывает | まれ Редко |
| しんたいしちかん 身体疾患 Физическое заболевание | 多い Часто | とき 時にあり Иногда бывает |
| やくぶつ 薬物の関与 Зависимость от лекарства | しばしばあり Часто бывает | なし Нет |
| かんきょう 環境の関与 Зависимость от окружающей среды | 多い Много | なし Нет |

Отличие «депрессивного состояния» от «агнозии»

«Уцу дзётай» - это такая болезнь, при которой наступают продолжительные признаки заболевания, то есть, падает настроение, наступает подавленное состояние, задерживается мышление. Есть большая разница между «уцу дзётай» и «нинчхисё», при «уцу дзётай» жалуются на такие признаки, как «печаль и тоска, чувство самообвинения (падает настроение и эмоция)».

『うつ状態』と『認知症』の違い

うつ状態は、気分が落ち込んでいくゆううつな状態、やる気が出ない、思考が遅くなるといった症状が続く病気です。うつ状態と認知症の大きな違いは、うつ状態では「悲しさや寂しさ、自責感など（気分や感情の障害）を訴える」ことです。

| | うつ状態 «депрессивное состояние» | 認知症 «агнозия» |
|--|---|---|
| 基本症状 Основные симптомы | 抑うつ症状、心氣的症状 Симптомы подавленной депрессии, душевные симптомы | 記憶・認知障害 Дефект памяти и сознания |
| 感情 Эмоция | 抑うつ気分持続 Продолжительность депрессивного настроения | 表面的、浅薄、動搖 Поверхностность, легкомысленность, беспокойность |
| 記憶・認知障害 Дефект памяти и сознания | 訴えるほど低下はない Не настолько ухудшается состояние, чтобы больной жаловался. | あり Есть |
| 言語理解・会話 Понимание языка; разговорная речь | 困難でない Не трудно | 困難である Трудно |
| 応答 Ответ | 遅延、真摯に考慮して「わからない」という Обдумывает долго и серьёзно, затем говорит «не знаю». | 言い訳、作話、怒り、ニアミス ヘンとう カンガ 返答、考え方ようとしない Оправдывание, выдуманный разговор, ярость, странный ответ, не хочет думать. |
| 感情の持続 Продолжительность эмоции | 数週間～数ヶ月 Несколько дней ~несколько недель | 永続的 Продолжительно |
| うつ状態の既往 Минувшее депрессивное состояние | 多い Много | 少ない Мало |
| 自殺願望 Желание самоубийства/ суицида | しばしば неоднократно | 少ない Мало |

「認知症の基礎知識」(認知症を知るホームページwww.e-65.net)より抜粋

«認知症の基礎知識» Основное знание «агнозии (болезнь с дефектом сознания)»

Выписка из (認知症を知るホームページwww.e-65.net)